

## **Психозы вызванные употреблением марихуаны.**

Данный вид психоза может возникнуть даже после первого употребления марихуаны. Весьма близко напоминает картину острой формы шизофрении и свидетельствует о грубых нарушениях в коре головного мозга.

## **Шизофрения и потребление марихуаны**

Употребление повышает риск возникновения шизофрении у подростков:

Однократное употребление до 16 лет — риск возрастает в 2,5 раза

Неоднократное употребление до 16 лет — риск возрастает в 6 раз.

Все каннабиноиды жирорастворимые вещества накапливаемые в тканях, богатых липидами: мозге, легких, половых органах, в клеточных мембранах. Проникая в ядра клеток они нарушают процессы синтеза ДНК, РНК и клеточных белков. Высвобождение каннабиноидов в систему кровообращения происходит медленно, в результате чего они могут обнаруживаться в организме в течение длительного периода времени.

**Будешь ли ты употреблять марихуану или нет—это предстоит решать тебе самому.**

**Но главное всегда помнить, что любой твой выбор прежде всего определяет ТВОЕ БУДУЩЕЕ!**

Учреждение  
«Гомельский областной наркологический диспансер».

## **Марихуана. Просто факты.**



**Наш адрес:  
Ул. Богданова 13  
Диспансерное детско-подростковое  
отделение**

**Телефон: (232)50-39-39  
Факс: (232)50-64-64**

**Диспансерное детско-подростковое  
отделение**

**Каннабис (каннабиноиды), конопля (марихуана) - марихуана** - наркотическое, психоактивное вещество наиболее распространенное после алкоголя и табака. Существует много мифов связанных с ее употреблением. Марихуану принято называть легким наркотиком, якобы нет вредных последствий и возникновения наркотической зависимости. Мы предлагаем Вам ознакомиться с фактами.

### **Кратковременное воздействие вызываемое употреблением:**

- Эйфория, чувство благополучия, беззаботное состояние, чередующееся с состоянием тревоги и беспокойства
- Ухудшение краткосрочной памяти, понимания, способности выполнения какой-либо задачи
- Изменение восприятия времени и пространства. Повышенная тактильная чувствительность, обострение зрительного и слухового восприятия, обоняния
- Большие количества могут вызвать панику, галлюцинации, беспокойство и дезориентацию.
- Опухание слизистой глаз, воспаленные глаза. Учащение пульса, усиление сердцебиения, повышение кровяного давления
- Колебания температуры тела
- Головная боль, головокружение, тошнота, ощущение голода
- Ухудшение концентрации внимания, нарушение способности правильно оценивать состояние. Снижение способности к вождению автомобиля и другой деятельности, требующей внимания
- Быстрая речь, безудержная болтливость

### **Последствия длительного употребления марихуаны для различных систем организма.**

**МОЗГ.** Марихуана влияет на мыслительные способности, способность к пониманию, абстрактному мышлению, обучению. Может вызвать состояние паники, беспокойства и токсические психозы.

**ЛЕГКИЕ.** Курение марихуаны вызывает все вредные эффекты, свойственные табакокурению: бронхиты, фарингиты, рак легких. Марихуана в большей степени, чем табак, способствует развитию заболеваний верхних дыхательных путей и отеков легких.

**СЕРДЦЕ.** Использование марихуаны вызывает усиленное сердцебиение, учащение пульса и повышение кровяного давления.

**РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА.** Марихуана содержит аналог растительных женских половых гормонов.

Курение снижает содержание тестостерона, основного мужского гормона. Продолжительное применение марихуаны может изменить гормональный фон настолько, что нарушается развитие половой функции подростков.

У мужчин уменьшается количество мужского гормона – тестостерона и увеличивается количества женских гормонов в результате чего, мужчины, прежде всего молодые, приобретают женские черты; у женщин нарушается менструальный цикл. Нарушается репродуктивная функция как у мужчин так и у женщин. Токсическое воздействие на развитие плода, сложности при вынашивании, тяжелое протекание родов и раннюю смерть младенцев.

**ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ.** Курение марихуаны может оказывать влияние на умственные и физические реакции, нарушать координа-

цию. Нарушается ответная реакция человека на световые и звуковые сигналы, ухудшается способность к выполнению последовательных операций и степень восприятия. Появляется сильная потребность двигаться, ходить, разговаривать; характерны неестественные позы в состоянии покоя.

**ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА.** Хроническая усталость, головные боли, тошнота.

При употреблении марихуаны быстро развивается психическая зависимость.

### **Признаки абстинентного синдрома при употреблении каннабиноидов.**

#### **Его проявления**

- Вспыльчивость и раздражительность
- Бессонница, потеря аппетита
- «сжимающие боли» в голове и сердце, боли в животе
- Озноб и тремор (дрожание)
- Повышение артериального давления, учащенное сердцебиение

### **Социальные последствия употребления марихуаны**

- Социальная самоизоляция
- Переход к более «тяжелым» наркотикам
- Связь с преступностью

